



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**CIRURGIÃO DENTISTA
PRÓTESE DENTÁRIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
 - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
 - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
 - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;” (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
 - () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
 - () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
 - () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
 - () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A classificação de Kennedy para PPR é a mais usada no mundo. Em 1935, Applegate sugeriu algumas regras para facilitar a aplicação da classificação de Kennedy. Na forma como é empregada, é **CORRETO** afirmar que:

- a) Um arco superior com quatro espaços protéticos na região anterior é classificado como Classe IV de Kennedy.
- b) Um arco será classificado como Classe I de Kennedy apenas quando houver espaços posteriores com extremidades livres, bilaterais e simétricos.
- c) Os espaços protéticos adicionais presentes em um arco, além daqueles que determinam sua classificação, são chamados de modificações, cuja quantidade é representada por algarismos romanos.
- d) Dependendo do caso clínico, a ausência do segundo molar pode ser desconsiderada na Classificação de Kennedy.

22) Toda reconstrução protética prioriza requisitos científicos para execução dos procedimentos clínicos. Sobre os requisitos de uma prótese parcial removível (PPR), é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A estética é, em geral, um diferencial positivo da PPR em relação às outras modalidades de prótese dentária.
- b) A estabilidade refere-se à ausência ou minimização de movimentos de rotação da PPR.
- c) Em uma PPR dentossuportada, a fixação (suporte) contribui para impedir injúrias aos tecidos moles subjacentes à prótese.
- d) Um único componente da PPR pode contribuir para mais de um requisito (retenção, estabilidade etc.).

23) Os retentores extracoronários ou grampos apresentam quatro elementos constituintes: braço de retenção, braço de oposição, apoio oclusal e corpo do grampo. A coluna da direita apresenta características de partes dos grampos, listadas na coluna da esquerda. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Apoio | () Une-se ao conector menor. |
| 2. Corpo | () Relaciona-se principalmente com o princípio da fixação. |
| 3. Braço de retenção | () Relaciona-se principalmente com o princípio da reciprocidade. |
| 4. Braço de oposição | () Contrapõe-se aos movimentos cêrvico-oclusais da prótese. |

Assinale a sequência correta:

- a) 2,4,1,3.
- b) 2,1,4,3.
- c) 1,4,3,2.
- d) 4,1,3,2.

24) O tipo de moldagem funcional é de extrema importância para perfeita confecção de uma Prótese Total Removível. Assinale a alternativa que apresenta a moldagem funcional indicada para um paciente edêntulo, que apresenta rebordo alveolar inferior com cordão fibroso móvel.

- a) moldagem boa aberta com compressão.
- b) moldagem boca fechada com compressão.
- c) moldagem boca aberta sem compressão.
- d) moldagem boca aberta mista.

25) As próteses unitárias do tipo faceta laminada, coroa metalocerâmica, coroa de porcelana são empregadas com frequência para substituição das perdas de substâncias dentárias. Analise as afirmativas e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de cima para baixo.

- () O desgaste da face vestibular para preparo de uma coroa de porcelana(metal-free) é feito em dois planos, como forma de retenção e terminação cervical em bisel para melhor adaptação e estética.
 - () Os melhores resultados estéticos, através das coroas metalocerâmicas, são conseguidos em dentes cujo preparo segue os parâmetros de espessura referente ao material de confecção, onde a face vestibular das coroas mistas(metalocerâmicas) apresenta desgaste mais acentuado para favorecer a estética.
 - () As coroas metalocerâmicas são indicadas para dentes anteriores e posteriores nos casos de alterações de forma, retentor de PPF e PPR, porém são contra-indicadas em dentes onde a estética é imperativa.
 - () A faceta laminada é indicação de escolha para dentes com face vestibular muito restaurada, muito escuros e bem posicionados no arco, com terminação cervical em ombro com bisel.
 - () O preparo para coroa de porcelana(metal-free) deve ser uniforme como meio de retenção e resistir aos esforços mastigatórios, reduzindo as chances de fratura.
- a) F, V, V, F, F.
 - b) F, V, F, V, F.
 - c) V, F, F, F, V.
 - d) V, V, F, V, F.

26) Segundo Turano; Turano (2009) existem vantagens na confecção de próteses totais imediatas, devido a atividade social, além da vaidade pessoal de não poder ficar edentado por um período de tempo. Com relação à adaptação imediatamente após as exodontias assinale a alternativa CORRETA:

- a) Controle de hemorragia, não há prova estética, rapidez na cura, proteção ao trauma.
- b) Controle de hemorragia, não há prova estética, rapidez na cura, proteção ao trauma, proteção contra infecção do exterior.
- c) Controle de hemorragia, rapidez na cura, proteção ao trauma, proteção contra infecção do exterior.
- d) Controle de hemorragia, rapidez na cura, proteção ao trauma, proteção contra infecção do exterior, reembasamento para compensar a retração cicatricial.

27) Pacientes edentulos perdem o fator proprioceptivo da mastigação e do arco reflexo. Precisamos nos valer de fatores determinantes da oclusão para reabilitação perfeita e harmônica com Próteses Total Removível. Assinale a alternativa CORRETA:

- a) A dimensão vertical de oclusão (DVO) também chamada de distancia vertical funcional, deve ser transportada para o articulador semi-ajustável, sendo convencionalmente ajustada no plano de cera inferior.
- b) O espaço funcional de pronúncia (EFP) é sinônimo de espaço funcional livre (EFL). Porém a variação não deve ser estabelecida sempre em 3mm e não deverá ser repetida para todos os pacientes.
- c) A dimensão vertical de oclusão (DVO) diminuída não é potencialmente prejudicial para as ATMs, porém o espaço da língua fica limitado, os músculos de expressão perdem a tonicidade e a face parece flácida.
- d) O equilíbrio da cabeça influencia a dimensão vertical de repouso (DVR), sendo necessário medi-la com paciente inclinado e a cabeça apoiada.

28) Apesar das próteses parciais removíveis serem um dos métodos mais antigos para reabilitar elementos dentários perdidos, são de menor custo e ser capazes restabelecer a harmonia do sistema mastigatorio: Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a sequência correta de cima para baixo.

- () O método de Willis é uma das três técnicas de delineamento que podem ser empregadas em PPR.
 - () No planejamento em PPR, os dentes remanescentes sempre são levados em consideração tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo.
 - () A finalidade do preparo de nicho para apoio oclusal é fortalecer a estrutura dentária frente aos esforços mastigatórios
 - () O correto posicionamento dos dentes artificiais em relação ao arco oposto é um dos fatores a serem avaliados na prova da armação metálica de uma PPR,
 - () O preparo de boca para PPR envolve procedimentos de diversas especialidades odontológicas, devem ser planejados de forma integrada.
- a) F,F,V,F,V.
 - b) F,V,F,F,V.
 - c) V,V,F,V,V.
 - d) F,V,V,F,F.

29) Durante a confecção de uma PTR (prótese total removível), o registro da relação intermaxilar dos planos de orientação de ser realizado:

- a) Na DVR com os côndilos em RC.
- b) Na DVO independente da posição condilar.
- c) Na DVR independente da posição condilar.
- d) Na DVO com os côndilos em RC.

30) Basicamente todo edentado total ou parcial é um candidato à possível colocação de implantes osseointegrados como alternativa de tratamento. Os implantes serão indicados como alternativa de tratamento em casos em que a PPR não apresente solução satisfatória.

- I. Problemas psicológicos em aceitar uma prótese parcial removível.
- II. Baixa tolerância da fibromucosa para suportar a PPR dentomucossuportada.
- III. Presença de hábitos parafuncionais que induzem a dor e instabilidade da prótese.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I, II e III estão corretas.
- d) I e II apenas.

31) As posições e as relações mandibulomaxilares de referência e tratamento apresentam características próprias que as individualizam. Analise as afirmativas e marque a alternativa INCORRETA:

- a) A máxima intercuspidação habitual é a posição em que ocorre maior número de contatos entre os dentes, independente da condição condilar, podendo ser alterada por procedimentos reabilitadores.
- b) Uma dimensão vertical de oclusão adequada é a que prevê equilíbrio muscular durante os processos de mastigação, deglutição e fala com os dentes intercuspidados sem espaço funcional livre entre eles.
- c) A relação centrada é uma posição em que os contatos dentários estão em maior número possível, e os condilos situados mais ântero-superiormente nas fossas mandibulares.
- d) Os anteparos posteriores, representados pelo Jig de Lucia e as Tiras de Leaf-Gauge são de enorme ajuda para a obtenção dos registros da RC.

32) Com relação às coroas provisórias das próteses unitárias fixas, marque a alternativa CORRETA das afirmações citadas abaixo:

- a) Apresentam biocompatibilidade devido à porosidade da resina.
- b) O reembasamento cervical das coroas provisórias favorece a exposição da margem gengival do preparo no ato da moldagem.
- c) A estabilidade de cor ainda é uma vantagem das resinas utilizadas na confecção de coroas provisórias.
- d) A adaptação marginal permanece, mesmo por longo período de uso, devido à resina apresentar resistência ao desgaste.

33) Com relação aos procedimentos e técnicas de confecção das próteses parciais removíveis, Analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro(V) ou Falso(F) e assinale a sequência correta de cima para baixo.

- () Numa PPR convencional, existe um eixo para inserção da prótese na arcada e outro para sua remoção.
- () Com exceção das extremidades dos braços de retenção, todos os componentes de uma PPR convencional devem situar-se em áreas expulsivas da arcada ou em cima do equador protético.
- () O uso do delineador é regido pelo princípio de que todas as retas perpendiculares a um plano são paralelas entre si.
- () O equador anatômico, demarcado pelo grafite em relação ao eixo de inserção escolhido, divide a coroa do elemento suporte em uma área retentiva e outra expulsiva.
- () A escolha da ponta calibradora de retenção a ser utilizada depende da liga metálica que será empregada na fundição da estrutura metálica da PPR.

Assinale a alternativa correta:

- a) V,V,V,F,F.
- b) F,F,V,F,V.
- c) V,F,V,F,V.
- d) F,V,V,F,V.

34) Originalmente formulado por Klein e Palmer em 1937, conhecido pelas iniciais CPO-D, o índice permanece sendo o mais utilizado em todo mundo, mantendo-se como o ponto básico de referência em saúde bucal, sendo um INDICADOR de:

- a) Prevalência de dentes cariados.
- b) Incidência de dentes perdidos, cariados e obturados.
- c) Severidade da cárie dentária em média por grupo de indivíduos.
- d) Prevalência de dentes cariados, perdidos e obturados por indivíduo.

35) De acordo com o mais recente relatório das condições de saúde bucal no Brasil, do Projeto SB Brasil 2010, considere as seguintes afirmativas relativas à cárie dentária.

- I. Foi confirmada a tendência de declínio de cárie na população infantil (12 anos).
- II. Ainda persistem níveis altos de cárie em dentição decídua.
- III. A redução na prevalência de cárie é percebida também na diminuição do edentulismo em população idosa.
- IV. Há um crescimento considerável na severidade da cárie aos 12 anos e na faixa etária de 15 a 19 anos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I.
- b) I e II apenas.
- c) Apenas III.
- d) I, II, III e a IV.

36) Ações de transformação do ambiente voltadas a facilitar o consumo de alimentos saudáveis, controle do tabagismo, da hipertensão arterial e do diabetes e o acesso aos produtos fluoretados e aos instrumentos de higiene bucal:

- a) Não são viáveis, pois dependem de diferentes profissionais.
- b) Não têm o mesmo efeito que ações específicas de prevenção individual das doenças bucais.
- c) Produzem impacto significativo na saúde bucal.
- d) Exigem recursos financeiros vultosos que o Brasil não tem.

37) A incorporação de auxiliares e técnicos nas atividades de promoção da saúde e de prevenção das doenças:

- a) Colabora para a integração de conhecimentos e práticas voltados à elevação dos níveis de saúde bucal.
- b) Prejudica a cobertura e qualidade dos serviços odontológicos.
- c) Não é recomendável, pois essas atividades são de responsabilidade de especialistas.
- d) Não ajuda na redução de ocorrência das doenças bucais na população.

38) De acordo com as diretrizes de atenção básica na odontologia, qualquer que seja a ação educativa no contexto da saúde bucal, DEVE:

- a) Abordar a etiologia da cárie dentária e da doença periodontal
- b) Ser planejada sem a participação do público alvo e incluir diferentes recursos áudio-visuais.
- c) Abordar o perigo do flúor e o benefício do açúcar.
- d) Ser planejada e precedida de uma atividade para levantar os conhecimentos e as expectativas que o público – alvo tem sobre o assunto.

39) De acordo com a International Association for the Study of Pain: “Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com danos reais ou potenciais em tecidos, percebida como dano”. Como questão de interesse investigativo para a epidemiologia, pode ser relatada por meio de:

- a) Exames de imagem que comprovem a existência de alguma lesão evidente, deflagradora da dor, como, por exemplo, radiografias.
- b) Perguntas diretas, feitas para os participantes dos estudos, por meio de questionários autopercebíveis ou aplicáveis face a face.
- c) Combinação de exames de imagem com questões incluídas em questionários.
- d) Não é possível avaliar a ocorrência de dor em inquéritos epidemiológicos.

40) A dor dentária é muito comum e demanda uma especial atenção pela sua intensidade e consequências. Entre as dimensões frequentemente avaliadas em inquéritos epidemiológicos de dor dentária, estão:

- a) A ocorrência, a intensidade e o impacto que produzem sobre distintos domínios de vida.
- b) A ocorrência, localização, o efeito afetivo e a qualidade.
- c) A intensidade, o impacto e o efeito afetivo.
- d) O efeito afetivo, qualidade e a ocorrência.

41) Com relação aos profissionais TPD e APD, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Compete ao TPD prestar assistência direta a clientes.
- () Compete ao APD, de forma independente, reproduzir modelos e vazamento de modelos em seus diversos tipos e a montagem de modelos em diversos tipos de articuladores.
- () O APD está impedido de prestar, sob qualquer forma, assistência direta ou indireta a pacientes, ser responsável por laboratório de prótese dentária e exercer atividade de forma autônoma.
- () Ao TPD compete ser responsável pelo treinamento de auxiliares e de serventes do laboratório de prótese odontológica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, F.
- b) F, F, V, V.
- c) F, V, F, V.
- d) V, F, V, F.

42) O ART (tratamento restaurador atraumático) foi apresentado à comunidade científica em 1994, na Organização Mundial de Saúde, no ano dedicado a saúde bucal. Das alternativas abaixo escolha a CORRETA:

- a) É um procedimento de remoção dos tecidos cariados usando instrumentos manuais e restauração da cavidade com um material restaurador adesivo, atualmente o ionômero de vidro.
- b) O TRA é uma adequação do meio bucal, remoção dos tecidos cariados usando instrumentos manuais e restauração da cavidade com um material restaurador adesivo, atualmente o ionômero de vidro.
- c) TRA não é um tratamento restaurador definitivo, tendo como objetivo a adequação do meio bucal e pode ser definida como um conjunto de medidas que leva ao controle da doença cárie.
- d) TRA é um tratamento restaurador definitivo, tendo como objetivo a adequação do meio bucal e pode ser definida como um conjunto de medidas que leva ao controle da doença cárie.

43) A consideração das características biológicas das bactérias é um fator determinante na escolha da antibióticoterapia mais adequada para combater o agente etiológico causador de uma infecção dessa natureza. Tendo em vista esse cuidado, todas essas substâncias possuem atividade inibitória da síntese proteica bacteriana, **EXCETO**:

- a) ceftriaxona.
- b) azitromicina.
- c) clindamicina.
- d) eritromicina.

44) A amoxicilina é uma penicilina semissintética com amplo espectro de ação derivada do núcleo básico da penicilina, o ácido 6-aminopenicilânico. Atualmente, existem fórmulas farmacêuticas que associam este princípio ativo ao ácido clavulânico. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. O ácido clavulânico possui a propriedade especial de inativar de modo irreversível as enzimas betalactamases produzidas por microorganismos resistentes às penicilinas.
- II. O clavulanato de potássio é um sal de absorção mais lenta que a amoxicilina triidratada, necessitando assim de preparações em suas formas farmacêuticas que favoreçam a obtenção de concentrações séricas terapêuticamente favoráveis.
- III. Apesar de tratar-se de uma associação medicamentosa de risco B para grávidas e lactação, sua administração em gestantes e lactantes deve ser feita com cautela pelo médico ou cirurgião-dentista.
- IV. Trata-se de uma associação de amplo espectro de ação antibiótica, eficaz contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, produtoras ou não de betalactamases, *Cryptococcus* spp. e *Pseudomonas* spp.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I e III.

45) Dentre as lesões em tecidos duros observáveis radiograficamente destaca-se o tumor odontogênico ceratocístico. Esta lesão apresenta-se como uma área radiolúcida, unilocular, também podendo ser observada com aspecto multilocular quando associada à Síndrome de Gorlin, com margens escleróticas frequentemente bem definidas, podendo ou não estar associado a dentes não erupcionados. A respeito do diagnóstico diferencial radiográfico desta lesão especificamente, é correto incluir as seguintes lesões, **EXCETO**:

- a) mixoma odontogênico.
- b) ameloblastoma.
- c) odontoma composto.
- d) cisto dentígero.

46) A sensação de queimação à injeção do anestésico local é um intercorrência relativamente comum durante a rotina odontológica. Este efeito adverso possui pouca variabilidade em suas manifestações, inclusive, mediante mudança de princípios ativos. A respeito desta manifestação clínica ao administrar os anestésicos locais, podemos afirmar CORRETAMENTE que:

- a) Trata-se de uma resposta normal e já esperada dos tecidos biológicos adjacentes ao plexo nervoso que se deseja anestésiar e que entraram em contato com a solução anestésica, caracterizando-se por uma ativa manifestação inicial promotora a permeabilidade transmembranosa dos íons Na⁺ ao meio citoplasmático, levando a um desequilíbrio eletrostático entre os meios, e posterior reelevação deste limiar de descarga pela própria solução anestésica.
- b) É uma reação já esperada dos tecidos biológicos adjacentes ao plexo nervoso que se deseja anestésiar e que entraram em contato com a solução anestésica, caracterizando-se por um momentâneo bloqueio a permeabilidade transmembranosa dos íons K⁺ ao meio intersticial, dificultando o reestabelecimento da homeostasia nos tecidos que entraram em contato com a solução anestésica aos seus gradientes iônicos normais.
- c) Existem controvérsias quanto aos reais agentes causadores desta sensação desagradável, porém, atualmente se considera que o pH seja um fator causal importante a se considerar nesta questão. Apesar dos esforços farmacêuticos em se obter princípios ativos menos ácidos, a inclusão de vasoconstritores nos anestésicos mostrou-se como um importante aliado na minimização deste fator negativo, tanto através da redução da quantidade de princípios ativos necessários às soluções, sem perda de eficácia, como contribuindo na elevação de seus pH's.
- d) Quando do relato pelo paciente de uma sensação dolorosa semelhante a queimação, de rápida resolução no momento e que após o efeito terapêutico do anestésico não se observa sensibilidade residual, pode-se suspeitar apenas de uma irritação local causada pelo pH. Lesões teciduais mais graves associadas a anestésicos tendem a sugerir como causa(s), além do pH: a injeção rápida, contaminação da solução ou solução com temperatura elevada.

47) Com relação ao Tratamento Restaurador Atraumático (ART) o cimento de ionômero de vidro é o material de escolha para vedamento das cavidades devido ao seu comportamento na cavidade oral, desta forma, podemos afirmar corretamente que:

- a) Tem maior união a dentina do que ao esmalte dental, liberação de flúor, biocompatibilidade.
- b) A solubilidade em água, durante as primeiras 24 horas, é baixa, com maior união a dentina do que ao esmalte dental, liberação de flúor, biocompatibilidade.
- c) A solubilidade em água, durante as primeiras 24 horas, é baixa, com maior união a dentina do que ao esmalte dental, biocompatibilidade, liberação de flúor com diminuição da possibilidade de caries secundárias.
- d) Adesividade à estrutura dentária, biocompatibilidade, liberação de flúor com diminuição do *Streptococcus mutans*, diminuindo a possibilidade de cáries secundárias.

48) As moldagens em Prótese total removível são importantes para definir os limites da área de suporte como também para estabelecer um íntimo contato dessa área com a base da prótese. Com relação aos procedimentos de moldagem é incorreto afirmar:

- a) No teste de selamento periférico, na maxila, o cabo da moldeira deve ser pressionado para baixo (teste de retenção vertical).
- b) A moldeira individual superior deve ultrapassar a linha vibratória.
- c) O cabo da moldeira individual funciona como instrumento que facilita no momento da moldagem, como também permite aferir o grau de retenção e estabilidade que se consegue durante a moldagem.
- d) Na moldagem anatômica pode ser usado godiva de baixa fusão, alginato ou silicone para moldagem odontológica.

49) A radiografia panorâmica é um importante exame radiográfico utilizado para o diagnóstico e planejamento terapêutico das doenças dos dentes e dos ossos da face. Atualmente, a maioria dos dentistas solicita esse exame por uma série de vantagens, **EXCETO**:

- a) O assoalho do seio maxilar e suas paredes anterior e posterior são bem observados.
- b) A dose de radiação (dose efetiva) é de aproximadamente 1/3 da utilizada para um exame intrabucal de boca toda.
- c) Evidencia estruturas ou anormalidades que não estejam na área focal.
- d) A visão geral dos maxilares permite avaliação de lesões ocultas, em ambos os lados da mandíbula.

50) Ao avaliar a imagem de uma radiografia panorâmica, o cirurgião-dentista deve estar atento para distinguir um defeito na técnica ou na tomada radiográfica de um achado radiográfico verdadeiro. A presença de uma faixa radiopaca no terço apical dos molares superiores sugere que:

- a) Houve uma inclinação latero – lateral do plano sagital mediano.
- b) Houve necessidade de aumento da quilovoltagem do aparelho de raio X.
- c) O paciente movimentou a cabeça no momento da tomada radiográfica.
- d) O paciente não posicionou sua língua na região de palato duro.

