



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**MÉDICO
CLÍNICA MÉDICA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorreção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- "Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto" (1º§)
 - "Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas" (2º§)
 - "uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder" (4º§)
 - "diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado" (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- "Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou." (2º§)
- "e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes," (2º§)
- "É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente." (2º§)
- "Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;" (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
 - () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
 - () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
 - () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
 - () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Sobre dieta e hipertensão arterial, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O padrão dietético DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), rico em frutas, hortaliças, fibras, minerais e laticínios com baixos teores de gordura, tem importante impacto na redução da pressão arterial (PA).
- b) A dieta do Mediterrâneo associa-se à redução da PA.
- c) Apesar das diferenças individuais de sensibilidade, modestas reduções na quantidade de sal não são, em geral, eficazes em reduzir a PA.
- d) Observa-se uma discreta redução da PA com a suplementação de óleo de peixe (ômega 3) em altas doses diárias e predominantemente nos idosos.

22) Sobre dieta e hipertensão arterial, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O consumo de duas ou mais porções diárias de laticínios magros correlacionou-se a menor incidência de hipertensão arterial.
- b) Os riscos de elevação da pressão arterial (PA) causados pela cafeína, em doses habituais, são relevantes.
- c) O chocolate amargo (com alto teor de cacau) pode promover discreta redução da PA, devido às altas concentrações de polifenóis.
- d) Claramente, uma quantidade maior de etanol eleva a PA e está associada a maiores morbidade e mortalidade cardiovasculares.

23) Considerando as recomendações da ADA (American Diabetes Association), analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () As pessoas com diabetes devem limitar ou evitar o consumo de bebidas adoçadas com qualquer adoçante calórico, incluindo os com alta quantidade de frutose e sacarose.
 - () Suplementação rotineira com antioxidantes, tais como as vitaminas E, C e betacaroteno, não é aconselhada devido à falta de evidências sobre e segurança a longo prazo.
 - () As evidências atuais permitem recomendar para pessoas com diabetes a suplementação ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 de cadeia longa (EPA e DHA) para a prevenção de eventos cardiovasculares.
- a) V, V, V.
 - b) F, F, V.
 - c) V, V, F.
 - d) F, F, F.

24) Sobre dieta e doenças cardiovasculares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Dietas vegetarianas são inversamente associadas com a incidência de doenças cardiovasculares.
- b) Há controvérsias sobre os efeitos da suplementação das diferentes castanhas em relação à redução da pressão arterial.
- c) Maior consumo de potássio se associa a menores valores de pressão arterial.
- d) Há consenso, atualmente, acerca dos benefícios de restrição rigorosa de sódio em todas as fases da insuficiência cardíaca crônica.

25) ACB, 63 anos, masculino diabético de há mais de 15 anos, assintomático e com bom controle glicêmico, apresenta à avaliação de rotina os seguintes exames laboratoriais:

- Creatinina sérica = 1,1 mg/dL
- Uréia sérica = 36 mg/dL
- Exame de urina – proteinúria ++, sem outras anormalidades
- Depuração da creatinina endógena (estimada pela fórmula CKD-EPI) = 91 ml/minuto
- Proteinúria de 24 horas = 1,1 g/24 h (Albuminúria = 613 mg/24 h)
- Glicemia de jejum 101 mg/dl

Considerando as diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), 2012, quanto ao estadiamento da doença renal, este paciente seria classificado como:

- a) G0; A3
- b) G1; A3
- c) G1; A2
- d) G0; A2

26) Em pacientes nefropatas diabéticos com filtração glomerular preservada, o controle glicêmico recomendado pelas diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), 2012; para prevenção da progressão da doença renal, corresponde a valor de hemoglobina A1C (glicosilada) :

- a) <6%.
- b) <6,5%.
- c) <7%.
- d) <7,5%.

27) Paciente previamente sadia, com 34 anos, na 26ª semana de gestação realizou teste de tolerância à glicose com 75 g de glicose oral que revelou os seguintes valores:

- Glicemia de jejum = 94 mg/dl
- Glicemia (1 hora) = 180 mg/dl
- Glicemia (2 horas) = 143 mg/dl

A gestante deve ser considerada:

- a) Normal
- b) Pré-diabética
- c) Portadora de diabetes mellitus gestacional
- d) Portadora de intolerância à glicose

28) Analise as medidas de prevenção da injúria renal aguda (IRA), abaixo, e à luz das diretrizes do KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), 2012, classifique-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

() Na ausência de choque hemorrágico, sugere-se usar cristalóide isotônico em vez de colóides (albumina ou amido) como tratamento inicial para a expansão do volume intravascular em pacientes de risco para IRA.

() Recomenda-se não usar dopamina em baixa dose para a prevenção da IRA.

() Recomenda-se não usar diuréticos para a prevenção da IRA.

- a) V, V, V.
- b) V, F, F.
- c) F, V, F.
- d) F, F, V.

29) Paciente feminina de 68 anos de idade, sem comorbidades conhecidas, não obesa, aferiu a pressão arterial em uma campanha de vacinação contra a gripe, quando se registraram valores de 160 x 104 mmHg. A paciente foi orientada a procurar uma unidade de saúde da família, onde durante mais três consultas detectaram-se níveis tensionais entre 160-163 x 100-104 mmHg. Os vários exames solicitados (eletrocardiograma, urina I, creatinina sérica, potássio sérico e glicemia) foram compatíveis com a normalidade. Entre as condutas abaixo, a mais adequada como tratamento inicial seria:

- a) Tratamento não farmacológico apenas.
- b) Tratamento não farmacológico e hidroclorotiazida 12,5 mg/d.
- c) Tratamento não farmacológico e associação entre hidroclorotiazida 12,5 mg/d e enalapril 10 mg/dia.
- d) Tratamento não farmacológico e enalapril 10 mg/d

30) Sobre o tratamento da hipertensão arterial com diuréticos, assinale a alternativa incorreta:

- a) Tem sido comprovada sua eficácia na redução da morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares.
- b) Os diuréticos podem provocar intolerância à glicose e aumento dos triglicérides séricos, porém esses efeitos não dependem da dose utilizada.
- c) Após, cerca de seis semanas de uso, seu principal efeito anti-hipertensivo não é a redução da volemia.
- d) Para o uso como anti-hipertensivos são preferidos os tiazídicos, em baixas dosagens.

31) Sobre as anafilaxias, assinale a alternativa incorreta:

- a) Corticosteroides podem prevenir recidiva ou anafilaxia protraída.
- b) Anti-histamínicos como a difenidramina são as drogas de escolha para tratamento inicial da anafilaxia aguda.
- c) A manifestação inicial de anafilaxia pode ser perda de consciência.
- d) Sintomas iniciais de maior gravidade desenvolvem-se rapidamente, atingem pico entre 3-30 minutos. Pode ocasionalmente haver um período de acalmia de 1 - 8 horas antes do desenvolvimento de uma segunda reação.

32) Entre os sinais de alarme da dengue, não se inclui:

- a) Esplenomegalia dolorosa.
- b) Irritabilidade.
- c) Vômitos persistentes.
- d) Diminuição da diurese.

33) Sobre os critérios de alta hospitalar na dengue, analise os abaixo e assinale a alternativa correta.

- ausência de febre durante 24 horas, sem uso de terapia antitérmica;
- melhora visível do quadro clínico;
- hematócrito normal e estável por 24 horas;
- plaquetas em elevação e acima de 50.000/mm³;
- estabilização hemodinâmica durante 24 horas;
- derrames cavitários, quando presentes, em regressão e sem repercussão clínica.

Para a alta hospitalar os pacientes precisam preencher:

- a) Pelo menos quatro dos critérios acima.
- b) Pelo menos três dos critérios acima, indistintamente.
- c) Pelo menos três dos critérios acima, sendo necessariamente um deles a estabilização hemodinâmica durante 24 horas.
- d) Todos os critérios acima.

34) Comparando-se o quadro clínico e laboratorial da dengue e da febre de Chikungunya, todas as manifestações abaixo são mais intensas na dengue, EXCETO:

- a) Trombocitopenia.
- b) Febre.
- c) Hematócrito elevado.
- d) Neutropenia.

35) Sobre a gonorreia, assinale a alternativa correta:

- a) A penicilina G benzatina em dose única é o tratamento de escolha.
- b) O risco de transmissão de um parceiro infectado a outro é de 10 a 20% por ato sexual.
- c) Não se recomenda atualmente o tratamento simultâneo para gonorreia e infecção por clamídia.
- d) Ciprofloxacina em dose única de 500 mg via oral é um esquema terapêutico recomendado.

36) Analise os anti-helmínticos abaixo:

- I. Pamoato de pirantel
- II. Albendazol
- III. Mebendazol

Pode (m) ser usados com segurança na gestação:

- a) Nenhum deles.
- b) II e III apenas.
- c) I apenas.
- d) II apenas.

37) Paciente masculino de 27 anos, homossexual, assintomático, com exame imunoenzimático negativo para detecção de anticorpos anti-HIV realiza um segundo exame imunoenzimático com resultado negativo, acompanhado do teste Immunoblot, que mostrou resultado positivo. Deve-se:

- a) Considerar amostra negativa para HIV.
- b) Considerar o caso inconclusivo e repetir exame imunoenzimático e Immunoblot.
- c) Considerar o caso inconclusivo, repetir Immunoblot e solicitar Imunofluorescência.
- d) Realizar teste de Western Blot.

- 38) Estudante de Engenharia, masculino, 24 anos de idade, sem nenhuma queixa atual, teve quadro diagnosticado de sífilis secundária há cerca de 10 meses. O exame físico é completamente normal e o paciente traz consigo os seguintes exames sorológicos para avaliação médica:
- VDRL = 1/4
 - FTA-ABS = positivo
- O diagnóstico mais provável é:
- a) Recidiva de sífilis.
 - b) Sífilis latente.
 - c) Sífilis curada.
 - d) Possível erro na determinação do VDRL, que deve ser repetido.
- 39) Sobre a **estrongiloidíase**, assinale a alternativa **incorreta**:
- a) É uma causa de larva migrans.
 - b) É associada ao costume de andar descalço.
 - c) O cambendazol é um dos tratamentos preconizados.
 - d) O método de Baermann-moraes é utilizado na identificação do parasita.
- 40) Paciente masculino de 64 anos, sem comorbidades conhecidas, fez uso há cerca de dois meses de cefuroxima para tratamento de quadro diagnosticado por médico de seu convênio como erisipela em membro inferior esquerdo. Apresenta-se à consulta em regular para bom estado geral, com temperatura de 38,0° C, PA de 140 x 64 mmHg, frequência cardíaca de 96 bpm, frequência respiratória de 24 ciclos por minuto sem outros dados relevantes. A ausculta pulmonar e a radiografia de tórax são compatíveis com pneumonia em lobo inferior esquerdo. A conduta mais adequada seria:
- a) Levofloxacina em regime de internação.
 - b) Levofloxacina oral em regime ambulatorial.
 - c) Azitromicina oral em regime ambulatorial.
 - d) Amoxicilina/Clavulanato + Claritromicina, por via venosa em regime de internação.
- 41) Paciente masculino de 53 anos de idade, diabético, dois dias após estada em um parque aquático apresentou quadro de diarreia intensa, 7-8 evacuações semilíquidas por dia com gotículas de sangue e febre de até 38,5°C. À consulta, há sinais discretos de desidratação, regular estado geral, normotensão e temperatura de 38°C. A glicemia capilar era de 190 mg/dl. A melhor conduta seria:
- a) Hidratação oral e solicitação de coprocultura apenas.
 - b) Hidratação venosa inicial, seguida por hidratação ora, e coprocultura apenas.
 - c) Hidratação oral e orientações gerais apenas.
 - d) Hidratação oral, coprocultura e início de antibioticoterapia com ciprofloxacino.
- 42) Cefaleia, ansiedade, euforia, insônia são efeitos adversos do seguinte medicamento utilizado para tratamento da tuberculose:
- a) Rifampicina
 - b) Pirazinamida
 - c) Isoniazida
 - d) Etambutol.
- 43) Sobre a insuficiência cardíaca crônica (IC), analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.
- () Os betabloqueadores (BB) associados a inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) ou bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA) determinam benefícios clínicos na mortalidade global, na morte por IC e na morte súbita, além de melhora dos sintomas e redução de reinternação por IC.
- () São BB recomendados para o tratamento da IC com disfunção sistólica o bisoprolol e o metoprolol.
- () IECA são indicados para IC com disfunção assintomática e sintomática de VE.
- a) V, V, V.
 - b) V, F, F.
 - c) F, V, F.
 - d) F, F, V.
- 44) Sobre o manejo clínico da síndrome coronariana aguda (SCA), assinale a alternativa **incorreta**:
- a) Ainda são insuficientes as evidências que apoiam o início rotineiro de inibidores da enzima conversora da angiotensina no ambiente pré-hospitalar e nas primeiras horas da chegada ao pronto-socorro.
 - b) Há evidências suficientes para apoiar a administração rotineira de betabloqueadores no cenário de atendimento pré-hospitalar ou durante a avaliação inicial na unidade de emergência.
 - c) Não existem evidências que comprovem o benefício do uso profilático de antiarrítmicos na SCA.
 - d) Na ausência de hipoxemia (saturação de oxigênio < 94%), a oxigenioterapia não deve ultrapassar 2-3 horas, podendo até ser omitida.
- 45) Analise os itens abaixo. Com relação à osteoporose em homens, assinale a alternativa que contenha os fatores de risco para fraturas:
- I. Consumo de álcool e raça negra.
 - II. Tabagismo atual e uso crônico de glicocorticoides.
 - III. Asma e doença cardiovascular.
 - IV. Hipogonadismo e idade acima dos 70 anos.
- a) I e II, apenas.
 - b) I e III, apenas.
 - c) III e IV, apenas.
 - d) II e IV, apenas.
- 46) Quanto ao tratamento medicamentoso da exacerbação da asma, assinale a alternativa correta:
- a) Os corticoides sistêmicos são essenciais no tratamento da exacerbação e devem ser usados precocemente.
 - b) Entre os agentes inalatórios indicados para o início do tratamento da exacerbação da asma os corticoides são os de primeira escolha.
 - c) A associação de brometo de ipatrópio aos beta-2-agonistas não exibe qualquer benefício adicional ao tratamento.
 - d) Não há qualquer evidência que suporte o uso de sulfato de magnésio na exacerbação da asma.
- 47) No acidente vascular cerebral isquêmico com oclusão da artéria cerebral média, são esperadas as seguintes manifestações, **EXCETO**:
- a) Anosognosia
 - b) Desorientação espacial
 - c) Hemiparesia contralateral.
 - d) Ataxia.

48) Considerando as hepatites virais, ocorre transmissão fecal-oral, no(s) seguinte(s) tipo(s):

- a) Hepatite A somente.
- b) Hepatite A e delta.
- c) Hepatite A e E.
- d) Hepatite A, delta e E.

49) Sobre a doença do refluxo gastresofágico (DRGE), analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () Pacientes adultos com manifestações de DRGE (pirose e ou regurgitação), com ou sem sintomas ou sinais de alarme (perda de peso, sangramento, odinofagia, disfagia etc.), devem ser submetidos ao exame de endoscopia digestiva alta (EDA) antes do tratamento.
 - () Em pacientes com sintoma de DRGE e EDA sem erosões esofágicas e, portanto, com probabilidade pré-teste de cerca de 50%, a pHmetria esofágica anormal define o diagnóstico de DRGE com certeza de 90% e, quando normal, afasta o diagnóstico com certeza de cerca de 95%.
 - () Não há associação entre DRGE e a apneia e/ou distúrbios do sono.
- a) F, V, F.
 - b) V, V, F.
 - c) F, F, V.
 - d) V, F, V.

50) Com o objetivo de detecção precoce de câncer de mama, mulheres usuárias de terapia hormonal deverão realizar mamografia a cada:

- a) Seis meses.
- b) Ano.
- c) 18 meses.
- d) Dois anos.